

## Orientações Farmacêuticas

# Estabilidade de medicamentos líquidos (orais e tópicos)




### Qual o tempo de armazenamento de um medicamento líquido, oral ou tópico, após aberto?

Normalmente, após aberto um frasco de xarope ou de alguma solução medicamentosa, perde-se a validade do fabricante e reduz-se o tempo de utilidade do remédio.

Além disso, na grande maioria dos medicamentos líquidos, orais ou tópicos, após abertos, reduz-se a estabilidade em no máximo 25% do tempo remanescente na embalagem original do medicamento.

**Exemplo:** um medicamento aberto (hoje), cujo tem mais 24 meses de validade pelo fabricante, torna-se válido por apenas 6 meses (24 Meses - 25%).



### Validade de alguns medicamentos líquidos, orais e tópicos, após abertos:

#### Acetilcisteína

Medicamento Genérico (Prati - Donaduzzi)

**14 dias após aberto**

#### Amoxicilina Clavulanato de Potássio

Medicamento Genérico (Sandoz)

**7 dias após aberto, se mantido sob refrigeração**

#### Axetilcefuroxima

Medicamento Genérico (Ranbaxy Farmacêutica)

**10 dias após aberto, se mantido sob refrigeração**

#### Cefadroxila

Medicamento Genérico (Sandoz)

**14 dias após reconstituição**

#### Ciclosporina

Sigmasporin Microral (Germed)

**2 meses após aberto**

#### Dipropionato de Beclometasona

Clenil A (Chiesi Farmacêutica)

**24 horas após aberto, se mantido sob refrigeração**



## Serviço farmacêutico de qualidade

### Farmácia APS

Elaborado por: Douglas E. Izidoro  
Farmacêutico Responsável Técnico

Onde há vida,  
**hapvida**

NotreDame  
Intermédica

ANS nº 368253

ANS nº 359017

Responsáveis Técnicos: Hapvida - Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão - CRM: 4.953CE |  
NotreDame Intermédica - Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque - CRM: 40.137SP