




Indicação

Spiriva Respimat é indicado para o tratamento de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Essa doença é caracterizada por tosse, catarro e falta de ar e ocorre, principalmente, em decorrência da bronquite crônica e enfisema pulmonar (irritação respiratória crônica), podendo também ser causada pela inalação da fumaça de cigarro. Pode estar associada a dispneia (falta de ar), melhora da qualidade de vida e redução dos episódios de exacerbação (crises de agravamento) da doença.

Como utilizar



Remover a base transparente

- Mantenha a tampa fechada.
- Pressione o dispositivo de segurança (botão cinza na lateral) e, ao mesmo tempo, com a sua outra mão, retire a base transparente.



Retornar a base transparente

- Coloque a base transparente de volta ao seu lugar até ouvir um som de "clique". Neste momento, verifique se a base transparente está no lado correto (o dispositivo de segurança - botão cinza - deve ser introduzido corretamente na base).



Inserir o frasco

- Insira o lado estreito do frasco metálico no inalador.
- Coloque o inalador sobre uma superfície firme (por exemplo, uma mesa), pressione para baixo, com firmeza, até que o frasco se encaixe e você ouça o som de "clique".



Virar

- Mantenha a tampa fechada.
- Vire a base transparente na direção das setas do rótulo até ouvir o som de um "clique" (meia volta).



Abrir

- Abra a tampa até que ela fique travada completamente quando aberta.



Pressionar

- Aponte o inalador em direção ao chão.
- Pressione o botão de aplicação (botão cinza escuro, próximo ao bocal).
- Feche a tampa.

ATENÇÃO

Para calibrar o inalador, repita os passos 4 a 6, até que seja visível uma "nuvem". Após, repita esse processo por mais três vezes. Assim, ao final, o seu inalador está pronto para o uso diário.

Uso Diário = VAPT

Vire - Abra - Pressione - Tampe



Vire

- Mantenha a tampa fechada.
- VIRE a base transparente na direção das setas do rótulo até ouvir um "clique" (meia volta).



Abra

- ABRA a tampa até que ela fique travada completamente na posição aberta.



Pressione

- Expire (solte o ar) lentamente.
- Coloque os lábios em torno do bocal, sem cobrir as entradas de ar.
- Enquanto inspira profundamente (ench a o peito de ar) lentamente pela boca, PRESSIONE o botão de aplicação (botão cinza escuro, próximo ao bocal) e continue inspirando (não precisa fazer nenhum esforço adicional para inspirar).
- Prenda a respiração por 10 segundos ou o quanto puder, com conforto e, em seguida, volte a respirar normalmente.
- Feche a tampa e repita mais uma vez os passos anteriores (VIRE, ABRA e PRESSIONE). Isso porque a posologia do medicamento é de duas doses consecutivas (2 puffs), uma vez ao dia.

4 Tampe

- Feche a tampa até o próximo uso.

Informações importantes

- Guarde esse medicamento em sua embalagem original.
- Quanto à conservação, este medicamento deve ser mantido em temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) e, em hipótese alguma, deve ser congelado.
- O número de lote e datas de fabricação e validade devem ser respeitadas vide embalagem.
- Não use esse (ou qualquer outro) medicamento com o prazo de validade vencido.
- É importante descartar o conjunto frasco + inalador RESPIMAT após três meses da inserção do frasco no inalador RESPIMAT. Vale destacar que este dispositivo inalatório não deve ser reutilizado.
- SPIRIVA é uma solução transparente e incolor para ser usada com o inalador RESPIMAT. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso o medicamento esteja dentro do prazo de validade e seja observada alguma mudança no aspecto, consulte um farmacêutico para avaliar a utilização.
- Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Farmácia APS

Elaborado por: Douglas E. Izidoro
Farmacêutico Responsável Técnico



ANS nº 368253

ANS nº 359017

Responsáveis Técnicos: Hapvida - Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão - CRM: 4.953CE |
NotreDame Intermédica - Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque - CRM: 40.137SP